

护士执业资格考试《答疑周刊》2019 年第 3 期

1. 【问题】1 周岁小儿的体重约为出生体重的

A. 1 倍

B. 1.5 倍

C. 3 倍

D. 6 倍

E. 7 倍

【正确答案】C

【答案解析】新生儿出生体重平均为 3kg。出生后第 1 个月增加 1~1.5kg，3 个月时体重是出生时的 2 倍（6kg），1 周岁时增至出生时的 3 倍（9kg），2 岁时增至出生时体重的 4 倍（12kg）。

2. 【问题】患者女性，23 岁，因甲状腺功能亢进住院，护士为其准备床单位应

A. 根据病情需要选择床位

B. 将其安排在危重病房

C. 将其安置在隔离病室

D. 按其要求安排床位

E. 安排在靠近护士站

【正确答案】A

【答案解析】病区护士接到住院处通知后，应立即根据病情准备床单位。备齐所需用物，将备用床改为暂空床，酌情加铺橡胶单和中单。对传染病病人应安置到隔离病室。

这道题目也可以用排除法，B 患者不是危重所以不用安排在危重病房。C 患者不是传染病所以 C 错误，D 医院并不是患者要住哪张床就住哪张床，那样就乱了所以 D 错误。安排靠近护士站的都是病情不稳定的，甲亢患者不存在这种危险，所以 E 错误。

3. 【问题】患儿男，11 个月。出现喷射性呕吐，前囟饱满，诊为化脓性脑膜炎，下列护理措施中不正确的是

A. 严密观察患儿生命体征及瞳孔变化

B. 保持室内安静，避免一切刺激

C. 将患儿头肩抬高 15° ~30° 侧卧位

D. 给予甘露醇

E. 增加补液量

【正确答案】E

【答案解析】化脓性脑膜炎患儿需严密观察生命体征及瞳孔变化，以及时发现病情变化，A 正确。需绝对卧床，床头抬高  $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，侧卧位或去枕平卧头偏向一侧，C 正确。保持室内安静舒适，避免一切刺激，B 正确。给予脱水降颅压、降温等对症处理，D 正确。因化脓性脑膜炎患者易发生颅内压增高、脑积水等并发症，故应适当限制补液量，准确记录 24 小时出入量，E 错误。

4. 【问题】患者男性，65 岁，诊断为胃癌，行胃大部切除术后，护士嘱患者取半坐卧位的目的是

- A. 减轻局部出血
- B. 减轻肺部淤血
- C. 防止腹膜粘连
- D. 减轻伤口缝合处张力
- E. 使静脉回流血量减少

【正确答案】D

【答案解析】腹部手术后病人。半坐卧位可减轻腹部切口缝合处的张力，缓解疼痛，利于伤口愈合。

5. 【问题】患者，女性，55 岁，因患中心型肺癌近日行全肺切除术，为防止纵膈移位，指导患者术后取何体位

- A. 端坐位
- B. 半坐卧位
- C. 头高脚低位
- D. 1/4 侧卧位
- E. 平卧位

【正确答案】D

【答案解析】全肺切除术者，应避免过度侧卧，可采取 1/4 侧卧位，以预防纵膈移位和压迫健侧肺而导致呼吸循环功能障碍。