

护士执业资格考试《答疑周刊》2019 年第 22 期

1. 【问题】学员提问：四种先天性心脏病的比较？

【解答】

项目	房间隔缺损	室间隔缺损	动脉导管未闭	法洛四联症
分型	潜伏青紫型	潜伏青紫型	潜伏青紫型	青紫型
症状	生长发育落后	生长发育落后	差异性紫绀，下半身明显	青紫，蹲踞，缺氧发作
杂音部位（胸骨左缘）	2~3 肋间 2~3 级收缩期喷射性杂音	3~4 肋间 3~5/6 级全收缩期反流性杂音	2 肋间响亮的连续性机器样杂音	2~4 肋间 2~3 级收缩期喷射性杂音
X 线	肺门“舞蹈征”	/	/	靴形心影
并发症	呼吸道感染、心衰	同左	同左	脑血栓、感染性心内膜炎

2. 【问题】学员提问：常见疾病吸氧浓度汇总？

【解答】①慢性肺源性心脏病，为了纠正缺氧和二氧化碳潴留；需经鼻导管持续低流量吸氧，氧浓度一般在 25%~29%，氧流量 1~2L/min。

②慢性阻塞性肺气肿，改善缺氧、缓解呼吸困难；经鼻导管吸氧、低流量（1~2L/min）低浓度（25%~29%）持续吸氧。

③急性心肌梗死，为了改善心肌缺氧，减轻疼痛；经鼻导管或面罩持续吸氧 4~6L/min。

④急性肺水肿，经鼻导管或面罩吸氧 6~8L/min，并以 30%~50%乙醇湿化，可以降低肺泡内泡沫的表面张力。

⑤急性左心衰，经鼻导管或面罩高流量（6~8L/min）吸氧，加入 30%~50%乙醇湿化降低肺泡及气管内泡沫的表面张力；使泡沫破裂，改善肺通气。

3. “事不过三”的时间点：

①细菌性痢疾患儿肠道隔离至连续 3 次便培养阴性为止。

②病人的传染性分泌物 3 次培养结果均为阴性方可解除隔离。

③急性肾盂肾炎停药后每周尿细菌培养 1 次，共 2~3 周，若均为阴性，可认为临床治愈。

④复发性流产是指同一性伴侣连续发生 3 次或 3 次以上的自然流产。每次流产多发生于同一妊娠月份。

⑤滴虫性阴道炎治愈标准：滴虫性阴道炎易于月经期后复发，应在月经干净后复查，连续三次滴虫检查阴性者为治愈。

4. “六六六”的时间点：

①日光照射消毒：在太阳下暴晒 6 小时。

②洗胃在 6 小时内进行最有效。

③脑血栓在 6 小时内进行溶栓。

④血管造影术后病人应平卧位，穿刺点加压包扎 24 小时，患肢制动 6~8 小时；清创术应争取在伤后 6~8 小时内施行；腰麻后去枕平卧 6~8 小时。

⑤产褥期为 6 周，产后 6 周可恢复性生活。

⑥因抢救急危患者未能及时书写病历的，应当在抢救结束后 6 小时内据实补记，并加以注明。

5. 【问题】学员提问：老师总结一下消化性溃疡常用的药物治疗。

药物	代表药	使用方法	不良反应
根治幽门螺杆菌	克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑		
抑制胃酸药物	抗酸药：碳酸氢钠、碳酸钙、氢氧化铝	餐后 1 小时或睡前服用，避免和奶制品、酸性食物同服	
	H ₂ 受体拮抗剂：西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁	餐中或餐后服用，也可睡前服用	乏力、头昏、嗜睡、腹泻
	质子泵抑制剂：奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑	奥美拉唑餐前服用，其他药物可餐后服用	奥美拉唑：头晕； 兰索拉唑：荨麻疹、皮疹、口苦、头痛、肝功能异常
粘膜保护药	硫糖铝	餐前 1 小时服用	便秘、口苦、皮疹、眩晕、嗜睡
	枸橼酸铋钾	餐前半小时服用	便秘、大便变黑、恶心

