

中级主管护师考试：《答疑周刊》2022年第9期

1. 【问题】结核菌素试验结果？

【解答】小于5mm为阴性，5~9mm为弱阳性，【医学教育网原创】10~19mm为阳性，20mm以上或局部有水泡、坏死为强阳性

2. 【问题】各级护理人员编制基本标准？

【解答】

项目	标准		
	一级医院	二级医院	三级医院
总人员编制（床：职工）	1:（1~1.4）	1:1.4	1:1.6
卫生技术人员比例（%）	80	75	72~75
护理人员占卫技人员比例（%）	38	50	50
医师与护理人员之比	1:1（含医士）	1:2	1:2
病床与病房护理人员之比 【医学教育网原创】	—	不少于1:0.4（300床以下不少于1:0.3）	1:0.4
护师及以上业务职称人员比例（占护理人员总数）（%）	≥10	≥20	≥30
护理员占护理人员总数比例（%）【医学教育网原创】	≤33	≤25	≤20

3. 【问题】格拉斯哥昏迷计分法的计分？

【解答】

睁眼反应	计分	言语反应	计分	运动反应	计分
主动睁眼	4	回答正确	5	遵医嘱活动	6
呼唤睁眼	3	回答错误	4	刺痛定位	5
刺痛睁眼	2	语无伦次	3	躲避刺痛	4
不能睁眼	1	只能发声	2	刺痛肢屈	3
		不能发声	1	刺痛肢伸	2
				不能活动	1

4. 【问题】小儿出疹性疾病鉴别？

【解答】

疾病	病原	发热与皮疹关系	皮疹特点	全身症状及其他特征
麻疹	麻疹病毒	发热 3~4 天出疹期热更高	红色斑丘疹，自头部→颈→躯干→四肢，退疹后无色素沉着及细小脱屑	呼吸道卡他性炎症、结膜炎，发热第 2~3 天口腔黏膜斑
风疹	风疹病毒	发热后半天至 1 天出疹	面部→躯干→四肢，斑丘疹，疹间有正常皮肤，退疹后无色素沉着及脱屑	全身症状轻，耳后，枕部淋巴结肿大并触痛【医学教育网原创】
幼儿急诊	人疱疹病毒 6 型	高热 3~5 天热退疹出	红色斑丘疹，颈及躯干部多见，一天出齐，次日消退	一般情况好，高热时可有惊厥，耳后、枕部淋巴结亦可肿大
猩红热	乙型溶血性链球菌	发热 1~2 天出疹，伴高热	皮肤弥漫充血，上有密集针尖大小丘疹，持续 2~3 天退疹，1 周后全身大片脱皮	高热，中毒症状重，咽峡炎，杨梅舌，环口苍白圈，扁桃体炎
肠道病毒感染	埃可病毒柯萨奇病毒	发热时或退热后出疹	散在斑疹或斑丘疹，很少融合，1~3 天消退，不脱屑，有时可呈紫癜样或水疱样皮疹	发热，咽痛，流涕、结膜炎，腹泻，全身或颈、枕后淋巴结肿大
药物疹		发热、服药史【医学教育网原创】	皮疹痒感，摩擦及受压部位多，与用药有关，斑丘疹、疱疹、猩红热样皮疹、荨麻疹	原发病并发症

