

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2023年第23期

问题索引：

1. 【问题】为什么颅脑手术病人在全麻醒后要头高脚低位？
2. 【问题】破伤风类毒素与破伤风抗毒素的区别是什么？
3. 【问题】诊疗部门是什么？
4. 【问题】阿托品化和阿托品中毒的症状有何区别？

具体解答：

1. 【问题】为什么颅脑手术病人在全麻醒后要头高脚低位？

【解答】病人是在全麻下进行了开颅术，术后清醒后，取头高脚低斜坡卧位，有助于颅内静脉回流，预防脑水肿[医学教育网原创]。

2. 【问题】破伤风类毒素与破伤风抗毒素的区别是什么？

【解答】破伤风类毒素是将破伤风毒素用甲醛脱敏制得的类毒素，是一种抗原，可用于预防破伤风。

破伤风抗毒素是用对[医学教育网原创]破伤风病具有免疫力的人或动物血清经加工精制而成的免疫抗体，注射到人体后，可直接对破伤风起到抵抗的作用，但这种抗毒素是被动的，而且在体内只能维持很短时间。

因此，预防破伤风最根本的措施还是注射破伤风类毒素，以使体内产生自动免疫抗体，从而达到长久的预防破伤风的目的。

3. 【问题】诊疗部门是什么？

【解答】诊疗部门[医学教育网原创]是医院的主要业务部门，它包括病房和门诊的各临床科室，如内科、外科、妇产科、儿科等，急诊科、预防保健科通常也属于诊疗部门。

4. 【问题】阿托品化和阿托品中毒的症状有何区别？

【解答】当病人有机磷农药中毒时，需要给予阿托品进行抢救，给予的阿托品的量应使患者出现阿托品化为止，当阿托品量过多会出现阿托品中毒。

阿托品化：患者瞳孔较前扩大、颜面潮红、口干、皮肤干燥、肺部湿啰音减少或消失、心率加快等。[医学教育/网]

阿托品中毒：意识模糊、烦躁不安、谵妄、抽搐、瞳孔扩大、昏迷和尿潴留等。两者的症状不同，要注意区分记忆。



正保医学教育网

www.med66.com