

2019 年公卫执业助理医师：《答疑周刊》第 9 期

【临床综合】

冠心病的主要危险因素包括

- A. 高血压、高胆固醇血症、吸烟和体力活动不足
- B. 高血压、肥胖、吸烟和糖尿病
- C. 高血压、高胆固醇血症、吸烟和糖尿病
- D. 高血压、肥胖、吸烟和 A 型行为类型
- E. 高血压、肥胖、应激和吸烟

【答案】C

【答案解析】目前公认的冠心病主要危险因素包括：高龄、男性、高脂血症、高血压、糖尿病和吸烟。其次是脑力活动紧张、体力活动少，食物含热量高、动物脂肪高、胆固醇高而抗氧化物质（如维生素 E、A 等）减少、肥胖、A 型性格、有家族性高脂血症史、某些微量元素如锌、硒等缺乏、体内铁储存增多、血同型半胱氨酸增高、胰岛素抵抗等。

【临床综合】

嗜铬细胞瘤下列临床表现中，最具特征性的应为

- A. 阵发性高血压或持续性高血压阵发性加剧
- B. 发作性头痛
- C. 胸闷、多汗、心动过速
- D. 恶心、呕吐、腹痛
- E. 焦虑、神经过敏

【答案】A

【答案解析】高血压是嗜铬细胞瘤患者最常见的临床症状，高血压的发作可是阵发性、持续性或在持续性高血压的基础上阵发性加重。

【流行病学】

指出下列哪一项是错误的

- A. 在队列研究中可用年数来表示
- B. 由发病率可计算出危险度
- C. 队列研究各种率都可作显著性检验
- D. 病例对照研究和队列研究都主要用于检验病因假设

E. 各种研究都要估算样本含量

【答案】C

【答案解析】队列研究中并不是所有的率都能做显著性检验的。此句话说的太绝对。

【流行病学】

以人年为单位计算的率为

A. 发病率

B. 发病密度

C. 病死率

D. 现患率

E. 死亡率

【答案】B

【答案解析】用人时为单位计算出来的率带有瞬时频率性质，称为发病密度。最常用的人时单位是人年。