

【中医内科学】

消渴病的病理变化主要是

A. 肾阴亏损

B. 胃热炽盛

C. 肺热津伤

D. 阴虚燥热

E. 阴阳两虚

学员提问：为什么选D？

答案及解析：本题答案为D。

【医学教育网原创】消渴病的病理性质为本虚标实。而以阴虚为本，燥热为标，两者互为因果。

故本题答案选D。

【传染病学】

有关暴发型流脑休克型的描述，下列哪项是错误的

A. 皮肤瘀点瘀斑迅速扩大并融合成片

B. 突发高热、头痛、呕吐

C. 口唇发绀、低血压

D. 精神萎靡、意识障碍

E. 脑膜刺激征明显、脑脊液呈化脓性改变

学员提问：为什么选E？

答案及解析：本题答案为E。

【医学教育网原创】暴发型流脑休克型：脑膜刺激征大多缺如，脑脊液大多澄清，细胞数正常或轻度增加，血培养多为阳性。

故本题答案选 E。

【中医妇科学】

某妇人阴部干涩，瘙痒灼热，夜间加重，伴五心烦热，烘热汗出，腰酸腿软，舌红少苔，脉细数无力。首选何方加减

- A. 六味地黄汤
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 易黄汤
- D. 知柏地黄汤
- E. 左归丸

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

【医学教育网原创】阴痒肝肾阴虚证

主要证候：阴部瘙痒难忍，干涩灼热，夜间加重，或会阴部肤色变浅白，皮肤粗糙，皲裂破溃；眩晕耳鸣，五心烦热，烘热汗出，腰酸腿软，口干不欲饮；舌红苔少，脉细数无丸，

治法：滋阴补肾，清肝止痒。

方药：知柏地黄汤加当归、栀子、白鲜皮。

故本题答案选 D。

【中医外科学】

下列哪项不是脱疽局部缺血期的表现

- A. 患肢发凉
- B. 患肢麻木
- C. 患肢足背动脉搏动减弱
- D. 间歇性跛行
- E. 静止痛

学员提问：为什么选 E？

答案及解析: 本题答案选 E。

【医学教育网原创】脱疽的临床表现:

血栓闭塞性脉管炎多发于寒冷季节, 以 20~40 岁男性多见; 常先一侧下肢发病, 继而累及对侧, 少数患者可累及上肢; 患者多有受冷、潮湿、嗜烟、外伤等病史。本病病程较长, 常在寒冷季节加重, 治愈后又可复发。根据疾病的发展过程, 临床一般可分为三期。

一期(局部缺血期): 患肢末端发凉, 怕冷, 麻木, 酸痛, 间歇性跛行。患肢可出现轻度肌肉萎缩, 皮肤干燥, 皮温稍低于健侧, 皮肤指压试验可见充盈缓慢, 足背动脉、胫后动脉搏动减弱, 部分患者小腿可出现游走性红硬条索(游走性血栓性浅静脉炎)。

二期(营养障碍期): 患肢发凉, 怕冷, 麻木, 坠胀疼痛, 间歇性跛行加重, 并出现静息痛。患肢肌肉明显萎缩, 皮肤干燥, 汗毛脱落, 趾甲增厚且生长缓慢, 皮肤苍白或潮红或紫紺, 患侧足背动脉、胫后动脉搏动消失。

三期(坏死期或坏疽期): 坏疽可先为一趾或数趾, 逐渐向上发展, 合并感染时, 足趾紫红肿胀、溃烂坏死, 呈湿性坏疽, 或足趾发黑, 干瘪, 呈干性坏疽。病程日久, 患者可出现疲乏无力、不欲饮食、口干、形体消瘦, 甚则壮热神昏。

根据肢体坏死的范围, 将坏疽分为 3 级: 1 级坏疽局限于足趾或手指部位, 2 级坏疽局限于足跖部位, 3 级坏疽发展至足背、足跟、踝关节及其上方。

故本题答案选 E。

【中医儿科学】

手足口病的临床特点是

- A. 初为疱疹, 很快成为脓疱, 夏秋季节多发
- B. 皮肤黏膜分批出现丘疹、疱疹、结痂
- C. 发热 3~4 天后, 热退疹出, 呈玫瑰色斑疹
- D. 风团样丘疹, 中心有针尖大小水疱, 伴瘙痒
- E. 疱疹分布于四肢远端、手足及口腔黏膜, 不结痂

学员提问: 为什么选 E?

答案及解析: 本题选 E。

【医学教育网原创】手足口病诊断要点

1. 发病前 1~2 周有手足口病接触史。

2. 多数患儿突然起病, 于发病前 1~2 天或发病的同时出现发热, 多在 38℃ 左右, 可伴头痛、咳嗽、流涕、口痛、纳差、恶心、呕吐、泄泻等症状。一般体温越高, 病程越长, 则病情越重。

3. 主要表现为口腔及手足部发生疱疹。口腔疱疹多发生在硬腭、颊部、齿龈、唇内及舌部, 破溃后形成小的溃疡, 疼痛较剧, 婴幼儿常表现烦躁、哭闹、流涎、拒食等。在口腔疱疹出现后 1~2 天可见皮肤斑丘疹, 呈离心性分布, 以手足部多见, 并很快变为疱疹, 疱疹呈圆形或椭圆形扁平凸起, 如米粒至豌豆大, 质地较硬, 多不破溃, 内有混浊液体, 周围绕以红晕。疱疹长轴与指、趾皮纹走向一致。少数患儿臂、腿、臀等部位也可出现疱疹, 但躯干及颜面部极少。疱疹一般 7~10 天消退, 疹退后无瘢痕及色素沉着。

4. 血象检查: 血白细胞计数正常, 淋巴细胞和单核细胞比值相对增高。

故本题答案选 E。

医学教育网中医执业助理医师: 《答疑周刊》2019 年第 48 期 (word 版下载)

