

【口腔解剖生理学】

下列哪项结构不属于下颌下三角的内容

- A. 下颌下腺
- B. 面动脉
- C. 面静脉
- D. 舌下腺
- E. 舌神经

【正确答案】D

【答案解析】下颌下三角的内容: 下颌下腺、下颌下淋巴结、面静脉、面动脉、舌神经、下颌下腺导管、舌下神经。

【口腔解剖生理学】

关于下颌下三角的境界, 叙述正确的是

- A. 界于胸锁乳突肌、二腹肌后腹及肩胛舌骨肌上腹之间
- B. 界于两侧二腹肌前腹与舌骨之间
- C. 界于胸锁乳突肌、肩胛舌骨肌上腹及颈前正中线之间
- D. 界于二腹肌前、后腹与下颌骨下缘之间
- E. 界于两侧胸锁乳突肌及下颌骨下缘之间

【正确答案】D

【答案解析】下颌下三角的境界: 上界为下颌骨下缘, 下界为二腹肌的前、后腹。其底由下颌舌骨肌、舌骨舌肌和咽上缩肌等构成。

【口腔组织病理学】

牙源性角化囊肿多发生于

- A. 以下颌第三磨牙区多见, 其次为上颌单尖牙, 上颌第三磨牙和下颌前牙区者
- B. 位于上颌恒侧切牙和单尖牙之间, 呈倒置的梨形, 相邻牙齿为活髓牙者
- C. 下颌磨牙及升支部
- D. 颈上部, 下颌角附近, 胸锁乳突肌上 1/3 前缘者
- E. 腭中线前部者

【正确答案】C

【答案解析】2005年的WHO头颈部肿瘤分类中已将牙源性角化囊肿命名为牙源性角化囊性瘤, 是一种良性、单囊或多囊、发生于颌骨内的牙源性肿瘤。临床上, 牙源性角化囊肿患者的年龄分布较广, 但好发在10~29岁之间。男性较女性多见, 病变多累及下颌磨牙及升支部。

【口腔组织病理学】

以下肿瘤(或囊肿)生长方式特殊, 主要沿颌骨前后方向生长的是

- A. 成釉细胞瘤
- B. 牙源性角化囊性瘤
- C. 牙源性钙化上皮瘤
- D. 成釉细胞纤维瘤
- E. 含牙囊肿

【正确答案】B

【答案解析】牙源性角化囊性瘤的生长方式特殊, 主要沿颌骨前后方向生长, 多数患者无明

显症状, 多在常规 X 线检查时偶然发现。

