

- 1.患者,男,38岁,哮喘史多年,居家隔离期间,不慎受凉感冒,出现呼吸困难、体温 38.5℃,因担心会集中隔离不愿去医院诊治,压力很大。根据患者的表现,应排在首位的护理诊断是
- A.气体交换受损
  - B.体温过高
  - C.精神困扰
  - D.皮肤完整性受损
  - E.清理呼吸道无效

【答案】A

- 2.日常工作中,体温单绘制脉搏曲线时,表示脉搏的符号是

- A.红○
- B.蓝○
- C.红●
- D.蓝●
- E.蓝×

【答案】C

- 3.下列哪项是病室温度过高对患者的影响

- A.对气管切开的患者尤为不利
- B.肌肉紧张
- C.干扰呼吸功能
- D.缺乏动力
- E.受凉

【答案】C

- 4.下列哪种情况能使用无菌持物钳?

- A.夹取油纱布
- B.夹取盛无菌生理盐水的治疗碗
- C.消毒皮肤
- D.换药
- E.夹取治疗巾包布

【答案】B

- 5.患者,男,56岁,因心前区疼痛,心绞痛收入心内科,患者进入病区,病房护士首先应该

- A.介绍病区,熟悉环境
- B.测量生命体征
- C.协助患者签署护理告知书
- D.通知医生诊查患者

E.护理评估

【答案】D

6.孕妇，28 岁，孕 29<sup>+5</sup>，产检示臀先露，需矫正胎位时应给予什么卧位？每次不超过多长时间？

- A.膝胸卧位，20 分钟
- B.膝胸卧位，15 分钟
- C.头高足低位，20 分钟
- D.截石位，15 分钟
- E.左侧卧位，15 分钟

【答案】B

7.患者女，69 岁，慢性阻塞性肺疾病 20 年，4 天前因喘憋不能平卧由门诊收入院，经治疗有所好转，今晨患者突发高热，体温 39.5℃，经诊断患者感染了细菌性肺炎。护士长给科室护士教学时，提到医院感染的诊断标准，以下不正确的是

- A.医务人员在医院的感染，也属于医院感染
- B.本次感染直接与上次住院有关
- C.有明确潜伏期的感染，住院日超过平均潜伏期后发生的感染。
- D.在原有感染基础上出现其他部位新的感染
- E.无明确潜伏期的感染，入院 24 小时后发生的感染

【答案】E

8.王女士，68 岁，有高血压、糖尿病病史，今突发脑出血入院，查体：意识模糊，血压 200mmHg/150mmHg，瞳孔对光反射迟钝，遵医嘱 24h 禁食，并给予口腔护理，下列说法正确的是

- A.检查患者有活动义齿，应取下放入乙醇溶液浸泡消毒
- B.协助患者漱口
- C.检查患者口腔有白色乳凝块分泌物，选用过氧化氢溶液漱口
- D.护士发现患者有口臭，选用 1%-4%的碳酸氢钠溶液
- E.使用开口器时应从白齿放入

【答案】E

9.下列关于合理饮食的作用说法错误的是

- A.对人体的发育起着决定性的作用，是维持生命活动的重要物质基础
- B.提供能量，保证机体各种生命活动
- C.调节机体功能
- D.辅助诊断及治疗疾病
- E.构成机体组织

【答案】D

10.患者，男，60岁，被诊断为尿毒症，遵医嘱给予低蛋白饮食，蛋白质的每天摄入不超过（），若摄入蛋白质，应摄入（）蛋白质。

- A.40g/d，动物性蛋白
- B.50g/d，动物性蛋白
- C.40g/d，植物性蛋白
- D.50g/d，植物性蛋白
- E.50g/d，优质蛋白

【答案】A

11.患者，男，37岁，建筑工地工人，一周前不慎踩到一枚生锈的铁钉，近日出现张口不便，来院治疗，遵医嘱行 TAT 过敏试验，结果如图所示，关于该患者的处理，下列说法正确的是（）

- A.结果提示阴性，可以使用 TAT
- B.结果提示阳性，需要每隔 30 分钟注射一次 TAT
- C.结果提示阳性，TAT 脱敏采用皮下注射
- D.患者出现这个结果与 IgE 抗体有关
- E.TAT 脱敏试验，需注射 3 次



【答案】D

12.下列有毒物中毒的灌洗液选用正确的是（）

- A.敌百虫中毒，选用高锰酸钾进行洗胃
- B.磷化锌中毒，首选牛奶进行洗胃
- C.浓盐酸中毒，选用碱性溶液进行洗胃，起到酸碱中和的作用
- D.乐果中毒，选用高锰酸钾进行洗胃
- E.百草枯中毒，选用硫酸钠导泻

【答案】A

13.李莉因反复出现皮肤瘀斑淤点，受小伤后出血时间较长，门诊检查发现凝血因子 V 缺乏，医生建议她输何种成分血


- A.新鲜冰冻血浆
- B.保存血浆
- C.血小板浓缩液
- D.冷沉淀
- E.浓缩红细胞

【答案】A

14. 王小明, 男, 70 岁, 咳嗽咳痰 20 年, 近 5 年出现越来越严重的呼吸困难, 诊断为慢性阻塞性肺疾病, 护士指导患者进行如图所示的呼吸锻炼, 目的是 ( )

- A. 为缓解呼吸困难
- B. 使呼吸阻力减低
- C. 防止呼气时小气道过早陷闭
- D. 增加呼吸效率
- E. 减低支气管高压

【答案】C



15. 张春, 女, 28 岁, 孕 28 周。患者鼻梁和面颊部呈蝶形分布的红斑, 查体: 关节肿痛, 血肌酐、尿素氮略升高, 针对该患者的护理措施正确的是 ( )

- A. 鼓励进食高糖、高蛋白和高维生素饮食, 例: 鸡蛋、香菇、大白菜等, 少食多餐。
- B. 避免日晒和寒冷的刺激, 外出时戴宽边帽、穿长袖衣和长裤。
- C. 不滥用外用药, 忌抓挠皮损部位, 指导患者使用皮肤刺激较小的化妆品
- D. 妊娠前 3 个月至妊娠期应用甲氨蝶呤
- E. 如病情允许, 可以染发烫发, 以便患者能更好的融入社会生活

【答案】B

16. 图中黄色的心肌细胞的功能和特征不包括

- A. 产生冲动
- B. 收缩功能
- C. 控制心脏的节律性活动
- D. 传导冲动
- E. 具有自律性、兴奋性和传导性的特征

【答案】B



17. 患者, 男, 72 岁, 因晚饭过饱, 于餐后和家人在小区内散步, 散步过程中, 突感呼吸困难, 主诉心前区疼痛。家人立即将其送入医院急诊, 接诊护士发现患者已处于晕厥状态, 立即通知医生。经检查, 医生诊断为“风湿性瓣膜病”。医生在为患者听诊时, 最可能可闻及的是

- A. 胸骨左缘第 3、4 肋间高调叹气样舒张期杂音
- B. 心尖区全收缩期高调一过性吹风样杂音
- C. 胸骨左缘第 2 肋间收缩期喷射音
- D. 胸骨右缘第 1~2 肋间粗糙而响亮的吹风样收缩期杂音
- E. 胸骨左缘第 2 肋间机械性杂音, 股动脉枪击音

【答案】C

18. 患者, 男, 78 岁, 患高血压有 10 年, 家中备有血压计, 每天记录测量血压的结果, 以供

医务人员参考，护士在随访时，患者咨询护士“日常血压控制的范围是多少？”，护士回答最恰当的是

- A. 小于 140/90mmHg
- B. 小于 150/90mmHg
- C. 小于 130/80mmHg
- D. 小于 120/80mmHg
- E. 小于 120/85mmHg

【答案】B

19. 下列药物中哪项不会引起胃粘膜损伤 ( )

- A. 阿司匹林
- B. 吡哌美辛
- C. 铁剂
- D. 氯化钾口服液
- E. 奥美拉唑

【答案】E

20. 关于胃癌的临床表现下列说法错误的是

- A. 早期胃癌无明显体征，进展期在上腹部可扪及肿块，有压痛
- B. 肿块多位于上腹部偏左，呈坚实可移动结节状
- C. 肝脏转移可出现肝大，并扪及坚硬结节，常伴黄疸
- D. 远处淋巴结转移时可扪及淋巴结，质硬不活动
- E. 晚期血行转移，常见于肝转移

【答案】B

21. 患者，男，50 岁，乙肝史 27 年，食欲减退，巩膜黄染，消瘦，近几年陆续出现面色苍白，腹部膨隆，诊断为肝硬化失代偿期，护士向患者介绍门静脉高压时，说明门静脉的血液来自消化器官和脾脏的回心血液，门腔静高压时交通支开放扩张，血流量增加，建立起侧支循环，重要的侧支循环不包括

- A. 食管下段和胃底静脉
- B. 腹壁和脐周静脉
- C. 脾静脉
- D. 痔静脉
- E. 腹后静脉

【答案】C

22. 患者，男，22 岁，车祸后股骨干骨折，面色苍白、皮肤湿冷，脉搏细速，血压下降，12 小时无尿，出现急性肾衰竭，针对患者的情况饮食护理，说法正确的是

- A.多食用坚果，补充维生素
- B.蛋白质的摄入量应限制为 1.0~1.2g/(Kg.d)
- C.告知病人及家属保证营养摄入的重要性，优先经肠外提供营养支持
- D.营养不良的病人，蛋白质摄入量可适当放宽
- E.给予充足热量、植物蛋白饮食，控制水、钠、钾的摄入

【答案】D

23.下列关于新型冠状病毒肺炎，下列说法正确的是

- A.根据肺炎的分类，冠状病毒肺炎，属于病毒性肺炎
- B.新型冠状病毒肺炎，具有传染性，主要通过接触传播，可出现粪便、尿液的核酸阳性
- C.新冠肺炎属于乙类传染病，需要经呼吸道隔离
- D.新冠肺炎，属于非典型肺炎，需要严密隔离
- E.新型冠状病毒肺炎，目前已经有了明确的治疗方案

【答案】D

24.患儿，男，10岁，2周前上呼吸道感染，近几日出现颜面浮肿，来院就诊，查体：血尿、蛋白尿，经一段时间的治疗后，有所好转，护士给患者家属做健康教育正确的是

- A.急性期病人应绝对卧床 4~6 周
- B.症状消退后可进行轻微户外活动
- C.血沉正常后进行体育活动
- D.Addis 计数正常后可以上学
- E.使用激素的过程中，会诱发患儿出现消化性溃疡，如果出现上消化道出血，需立即停药

【答案】A

25.癫痫的护理措施不正确的是 ( )

- A.告知病人有前驱症状时立即平卧
- B.活动状态发作时，切忌用力按压病人抽搐肢体，以防骨折和脱臼
- C.将压舌板或筷子、纱布、手绢、小布卷等置于病人口腔一侧上下白齿之间，防止舌、口唇和颊部咬伤
- D.患者症状缓解时可以减药或停药
- E.癫痫的患者不可以从事危险性高、压力大的活动

【答案】D

26.患者刘某，男，57岁，有高血压病史，冬季过年时酒后情绪激动，突然倒地，一侧肢体偏瘫，且有喷射性呕吐，首先考虑 ( )

- A.脑血栓形成
- B.脑出血
- C.蛛网膜下腔出血

- D.短暂性脑缺血发作  
E.颅内肿瘤

【答案】B

27.某患者因近两日剧烈运动及汗蒸，大量流汗，8小时前感四肢无力，后渐不能行走，伴恶心、呕吐，无意识障碍。入院后生命体征T:36.5°C，P:53次/分，R:19次/分，BP:107/75mmHg，查血钾2.3mmol/L，心电图示：窦性心动过缓、房性早搏、I°房室传导阻滞，查体：双上肢肌力3级，双下肢肌力2级，给予静脉补钾，该患者的护理诊断不包括（）

- A.活动无耐力  
B.疼痛  
C.知识缺乏  
D.潜在并发症:心搏骤停  
E.体液不足

【答案】E

28.张某烧开水时，不慎将开水打翻，烫伤腿部，腿部大片红斑、干燥、灼烧感严重，局部红肿明显，散在两个大小不一水疱，张某当即的处理方法不正确的是（）

- A.用冷水冲洗，将腿部泡在冷水中，直至感受不到疼痛或灼烧感为止  
B.较大水疱挤破水疱，除去表皮，放出疱液后用干净纱布包扎  
C.创面冲洗沾干后，涂上烫伤膏  
D.水疱较小的无需刺破放液，只需清洗干后擦烫伤膏，不要包扎  
E.红斑、干燥区域的烫伤，不用处理，一周后会自愈，不会出现色素沉着或瘢痕

【答案】B

29.颅内压增高患者冬眠低温疗法操作时的注意事项不包括（）

- A.不宜翻身和移动身体  
B.严密观察生命体征变化,如有异常应及时通知医生停药。  
C.密切监测体温变化，以防并发症  
D.一般3~5日后停止治疗，应先停药物降温，再逐步停止物理降温  
E.开始冬眠低温疗法时，先低温，再给冬眠合剂

【答案】D

30.患者，男性，50岁。以进行性吞咽困难半年之主诉入院。X线钡餐透视诊断为食管癌。患者突发出现如图所示的表现，提示癌肿侵袭到的部位是

- A.喉返神经  
B.颈交感神经  
C.支气管  
D.胸主动脉



E.下腔静脉

【答案】D

31.患者，男，45岁，甲亢史5年，药物治疗疗效甚微，行甲状腺一侧切除术后，发生窒息最可能的原因是（）

A.出血压迫气管

B.喉返神经损伤

C.低血钙

D.气管塌陷

E.喉上神经内侧支损伤

【答案】A

32.胸壁损伤中最易发生纵隔扑动的是（）

A.闭合性气胸

B.开放性气胸

C.张力性气胸

D.血胸

E.脓胸

【答案】B

33.患者女性，58岁，胃癌行远端胃切除术后1周，进食后出现上腹绞痛，随即呕吐出大量不含食物的胆汁，呕吐后症状缓解，首先考虑的并发症是（）。

A.输入襻梗阻

B.输出襻梗阻

C.胃排空障碍

D.术后出血

E.吻合口梗阻

【答案】E

34.患者女，48岁，行腹会阴联合直肠癌根治术后2天，术后行结肠造口，下列患者复述的宣教内容中错误的是（）。

A.正常造口应为粉色，若色泽变暗、发黑提示肠管缺血坏死

B.更换造口袋时，可用温水清洁造口及周围皮肤

C.术后3~5日内取造口侧卧位

D.造口开放后，避免进食过多的大蒜、豆类等

E.术后当天或2-3天开放造口

【答案】C



35. 患者女, 42 岁, 以“大便有物脱出、出血 10 年, 加重 2 天”为主诉入院, 患者行混合痔内扎外剥术后, 下列护理措施中正确的是 ( )。

- A. 术后 6 小时仍未排尿应立即导尿
- B. 排便后, 先更换敷料后坐浴
- C. 患者术后第 5 日排便, 其粪便表面仍有出血, 应及时通知医生
- D. 若松解敷料后仍有肛门疼痛, 可适当给予止痛药物
- E. 术后 1~2 日应以无渣或少渣, 富含膳食纤维的普食

【答案】D

36. 患者, 男, 36 岁。吸烟 18 年。近日因左下肢常感觉麻木、酸胀乏力。走路时常出现间歇性跛行。遂来医院就诊, 经医生诊断为“血栓闭塞性脉管炎”。该疾病的病理好发于

- A. ①
- B. ⑤
- C. ②
- D. ③
- E. ④

【答案】B



37. 患者, 24 岁, 在医院任职 ICU 男护士, 因近期 5 个月经常独自为体重 250 斤患者翻身而引起持久性腰骶部钝痛和活动障碍, 一天前被自行车撞到腰部, 左下肢感觉减退、肌力下降, X 线显示: L5~S1 部位侧凸, 左侧直腿抬高试验 (+), 诊断为 ( )

- A. 神经根型颈椎病
- B. 腰椎间盘突出症
- C. 脊髓型颈椎病
- D. 椎动脉型颈椎病
- E. 交感神经性颈椎病

【答案】B

38. 关于妊娠期妇女循环及血液系统变化不正确的是 ( )

- A. 妊娠期下肢静脉压增加, 易发生下肢静脉曲张
- B. 红细胞的增加多于血浆的增加
- C. 凝血因子增加, 血液处于高凝状态, 血沉加快
- D. 血容量至妊娠 32-34 周时达高峰
- E. 患者红细胞计数减少, 出现生理性贫血

【答案】B

39.某孕妇，妊娠 20 周，突然出现腹痛、阴道流血，妇科检查提示：子宫小于停经周数，不断有血液自宫颈口内流出，可见胎盘组织堵塞于宫颈口，该孕妇可能发生了什么（）

- A.先兆流产
- B.难免流产
- C.不全流产
- D.稽留流产
- E.习惯性流产

【答案】C

40.某孕妇，26 岁，产检手测子宫底高度脐上三横指，尺测耻上子宫底高度 26.5cm，此时的妊娠周数大概是（）。

- A.20 周
- B.24 周
- C.28 周
- D.32 周
- E.36 周

【答案】C

41.对于先兆早产的护理措施，错误的是（）

- A.采取左侧卧位
- B.使用硫酸镁抑制宫缩，可时舌下含服硝苯地平联合作用增强疗效
- C.使用沙丁胺醇抑制宫缩时，可出现心跳加快、血压下降、血糖升高等副作用
- D.对于妊娠 35 周前的先兆早产者，在分娩前应给予地塞米松促进胎肺成熟
- E.保胎期间，禁止性生活

【答案】B

42.患者女，36 岁，因怀疑盆腔内有积液，拟行阴道后穹窿穿刺术，应为患者采取哪种体位（）。

- A.5
- B.1
- C.2
- D.3
- E.4



【答案】D

43.新生儿出生后，行 Apgar 评分为 1 分的是（）

- A.新生儿心率为 85 次/分
- B.新生儿肌张力松弛

- C.弹足底或插鼻时出现哭、打喷嚏反应
- D.呼吸规律
- E.全身皮肤青紫

【答案】A

44.下列哪项不是安置宫内节育器的并发症（）。

- A.节育器异位
- B.腰腹酸胀感
- C.感染
- D.带器妊娠
- E.节育器脱落

【答案】B

45.给围绝经期的女性做护理评估，不会出现下列哪项护理诊断

- A.有感染的危险与机体抵抗力低下有关
- B.自我形象紊乱与月经紊乱有关
- C.营养失调：低于机体需要量
- D.焦虑与内分泌改变有关
- E.睡眠形态紊乱

【答案】C

46.下面哪项不是病理性黄疸的特点

- A.出生后 2-3 天内出现
- B.黄疸程度重
- C.黄疸持续时间长
- D.黄疸退而复现
- E.黄疸数值大于 221-256umol/L

【答案】A

47.患儿男，8 个月，牛乳喂养，未添加辅食，近一月来常有烦躁、精神欠佳表现，纳差，查体可见皮肤黏膜苍白，肝大、脾大，还出现图示的临床表现，该患儿最有可能的诊断是（）

- A、营养性巨幼细胞贫血
- B、营养性缺铁性贫血
- C、特发性血小板减少性紫癜
- D、自身免疫性溶血性贫血
- E.再生障碍性贫血



【答案】B

48. 疱疹性口腔炎患儿为预防感染须局部用药，做法错误的是 ( )

- A. 将棉球放置于颊粘膜腮腺管口处，以隔断唾液
- B. 涂抹 2% 金霉素鱼肝油
- C. 涂药后嘱患儿闭口 10 分钟，再将棉球取出
- D. 涂药后不可立即漱口、进食
- E. 可选用依沙丫啶漱口

【答案】B

49. 患儿，男，8 岁，发热 2 天，体温 38.5℃，咳嗽、咳痰，且出现图示的表现，该患儿的传染期为 ( )

- A. 出疹前 5 天至出疹后 5 天
- B. 出疹前 7 天至出疹后 7 天
- C. 出疹前 5 天至出疹后 10 天
- D. 出疹前 10 天至出疹后 10 天
- E. 潜伏期至出疹后 10 天



【答案】C

50. 小儿体格发育监测的主要内容是

- A. 体重
- B. 身高
- C. 头围
- D. 胸围
- E. 牙齿

【答案】B