

【诊断学基础】

关于痰液标本收集的内容，说法错误的是

- A. 留痰前应先漱口
- B. 用力咳出气管深处的痰液
- C. 以清晨第一口痰为宜
- D. 可有适量鼻咽分泌物
- E. 注意避免混入唾液

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。

痰液标本收集：留痰前应先漱口，用力咳出【医学教育网原创】气管深处的痰液，以清晨第一口痰为宜，注意避免混入唾液和鼻咽分泌物。

故本题答案选 D。

【中药学】

既能够治疗血虚诸证，又能用于女子月经不调、经闭、痛经的药物是

- A. 桃仁
- B. 红花
- C. 当归
- D. 白芍
- E. 何首乌

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

当归主治：（1）血虚诸证。本品为补【医学教育网原创】血之圣药。常与黄芪等补气药同用，如当归补血汤等。

(2) 血虚血瘀，月经不调，经闭，痛经。本品既能补血、活血，又能调经，为妇科补血调经的要药。

(3) 虚寒性腹痛，跌打损伤，痈疽疮疡，风寒痹痛。本品辛行温通，为活血行气之要药。既能补血活血，又能散寒止痛，可随证配伍应用。

(4) 血虚肠燥便秘。本品养血润肠通便，常配火麻仁、肉苁蓉等同用。

故本题答案选 C。

【中药学】

麻疹的好发年龄哪种说法正确

A. 6 个月~1 岁

B. 6 个月~3 岁

C. 6 个月~5 岁

D. 6 个月~7 岁

E. 6 个月~10 岁

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案为 C。

一年四季均可发病，以冬春季多见，6 个月【医学教育网原创】至 5 岁发病率较高，容易并发肺炎。

故本题答案选 C。

【中医妇科学】

产后血晕与产后子痫的鉴别要点是

A. 是否发生在产后 24 小时之内

B. 是否意识清楚

C. 是否四肢抽搐

D. 既往是否有高血压病史

E. 是否有角弓反张

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题答案选 C。

产后子痫虽都可见神志不清，但产后子痫除了【医学教育网原创】产前有头晕目眩、头面及四肢浮肿、高血压、蛋白尿等病史以外，尚有典型的抽搐症状，可与产后血晕相鉴别。故本题答案选 C。

【中医基础理论】

瘀血所致出血的特点是

- A. 出血量多
- B. 出血不畅
- C. 出血夹有血块
- D. 出血伴有疼痛
- E. 出血量少

学员提问：为什么选 C？

答案及解析：本题选 C。

因瘀血阻滞，损伤血络，血逸脉外而见出血色紫【医学教育网原创】黯，或夹有瘀血块。

故本题答案选 C。