

医学教育网临床执业医师:《答疑周刊》2022年第5期

下面两个总结都是针对呼吸系统的相关疾病,希望大家通过两个表格对比比对和记忆,轻松掌握考试知识点。

问题索引:

1. 【问题】原发性肺结核与继发性肺结核的区别?
2. 【问题】张力性气胸、开放性气胸及闭合性气胸的如何鉴别?

具体解答:

1. 【问题】

【解答】

	原发性肺结核	继发性肺结核
发病年龄	儿童	成人
起病原因	初次感染结核杆菌	再次感染结核杆菌
病变部位	右肺[医学教育网原创] 上叶下部或下叶上部靠近胸膜	肺尖
病变特点	开始为渗出性病变,继而中央发生干酪样坏死	由于变态反应,病变发展迅速易发生干[医学教育网原创]酪样坏死

2. 【问题】张力性气胸、开放性气胸及闭合性气胸的如何鉴别?

【解答】

	闭合性气胸	张力性气胸	开放性气胸
视诊	胸廓饱满	胸廓饱满	胸廓饱满
触诊纵膈气管	向健侧移位	向健侧显著移位	纵膈向健侧移位可致纵膈扑动
叩诊	呈鼓[医学教育网原创]音	呈高度鼓音	呈鼓音
听诊	呼吸音减弱	呼吸音↓/消失	呼吸音↓/消失
伤肺	萎缩	严重萎缩	完全萎缩

胸片 首选	不同程度肺萎缩	肺完全塌陷、严重胸腔积气	肺萎缩,大量胸腔积气
治疗	<ul style="list-style-type: none"> ◆肺压缩量<20%者先行观察, 2~3w 可自行吸收 ◆>20%者先穿刺抽气 ◆自觉症状重者行闭式引流 	<ul style="list-style-type: none"> ◆立即穿刺抽气进[医学教育网原创]行减压处理 ◆自觉症状重者行闭式引流 ◆必要开胸 	<ul style="list-style-type: none"> ◆立即将开放性变为闭合性(凡士林纱+棉垫覆盖伤口) ◆自觉症状重者行闭式引流 ◆必要[医学教育网原创]开胸