

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2022 年第 63 期

问题索引：

1. 【问题】艾瑞克森的心理社会发展过程中，青春期的危机及正性指标是什么？
2. 【问题】植皮用的皮片有哪几种？都有什么特点？
3. 【问题】半肝及以上切除者，术后需要间歇给氧多长时间？
4. 【问题】引起门静脉高压症的病因、肝前型、肝内型、肝后型都是什么？

具体解答：

1. 【问题】艾瑞克森的心理社会发展过程中，青春期的危机及正性指标是什么？

【解答】艾瑞克森将人格发分为 8 期，其中青春期是在 12~18 岁，该时期的危机是自我认同对角色紊乱，其正性解决指标是有自我认同感及发展自身潜能的计划；[医学教育网原创]负性解决指标是角色模糊不清，难以进入角色要求。

2. 【问题】植皮用的皮片有哪几种？都有什么特点？

【解答】植皮所用的皮片按照所取皮片厚度不同，可分为 4 种：

(1) 表层皮片：成活率高，用于消灭肉芽创面，但过薄，易变形、有色素沉着，不宜植入面部、手掌、足底等处。

(2) 中厚皮片：含表皮及部分真皮层，用途最广，存活率高，愈合后功能好，不易收缩，色素编号不大[医学教育网原创]。

(3) 全厚皮片：包括全层皮肤，不含有皮下组织，需在新鲜创面上移植，愈合后功能好。

(4) 点状植皮：皮片面积小，很易存活，用于肉芽创面移植容易成功。

3. 【问题】半肝及以上切除者，术后需要间歇给氧多长时间？

【解答】接受半肝以上切除者，需间歇给氧 3~4 日。

4. 【问题】引起门静脉高压症的病因、肝前型、肝内型、肝后型都是什么？

**【解答】**门静脉血流阻力增加是门静脉高压症的始动因素，根据阻力增加的部分分为 3 型：

(1) 肝前型：[医学教育网原创]肝外门静脉血栓形成、先天性畸形、肝门肿瘤压迫等；

(2) 肝内型：最常见，分为窦前型、肝窦型、窦后型，其中肝炎后肝硬化是引起肝窦和窦后阻塞性门静脉高压症的常见病因；常见的肝内窦阻塞病因是血吸虫病；

(3) 肝后型：巴德-吉亚利综合症（布-加综合症/Budd-Chiari 综合症）、缩窄性心包炎等。

