

全科主治医师 —— 基础测评 50 题

医学教育网 著



扫码回复“基础测评”领取答案及解析

《基础测评 50 题》

一、A1 型题

1.正态分布曲线下的面积分布规律 ($\mu-1.96\sigma$, $\mu+1.96\sigma$) 代表

A.68.27%

B.90%

C.95%

D.99%

E.100%

2.变异系数表示

A.平均水平

B.对称分布

C.误差

D.相对变异度

E.集中趋势

3.高血压病人要求每日食盐摄入量最多为

- A.6g
- B.6.5g
- C.7g
- D.8g
- E.5g

4.下列哪些是开展社区健康教育与健康促进的意义

- A.提高社区居民素质，促进精神文明建设
- B.通过健康教育与健康促进，预防控制社区疾病
- C.增强社区居民健康意识，提高自我保健能力
- D.完善社区卫生服务，提高社区卫生服务综合效益
- E.以上都是

5.不属于社区健康教育与健康促进的重点人群是

- A.儿童和青少年
- B.妇女
- C.壮年人
- D.老年人



E.残疾人

6.心理咨询的原则不包括

A.自主性原则

B.差异性原则

C.信赖性原则

D.主导性原则

E.保密性原则

7.儿童时期那个系统发育最迟

A.呼吸系统

B.循环系统

C.淋巴系统

D.生殖系统

E.神经系统

8.维生素 D 缺乏病可靠的早期诊断指标是

A.血钙降低

B.血磷降低

C.血镁降低

D.血 1, 25-(OH)₂-D₃ 降低

E.血碱性磷酸酶增高

9.营养不良患儿皮下脂肪消减的顺序是

A.躯干 - 臀部 - 四肢 - 腹部 - 面颊

B.面颊部 - 腹部 - 躯干 - 臀部 - 四肢

C.腹部 - 躯干 - 臀 - 四肢 - 面颊

D.四肢 - 躯干 - 腹部 - 面颊

E.躯干 - 臀部 - 腹部 - 面颊

10.营养性维生素 D 缺乏性手足搐搦症与佝偻病发病机理的不同点在于

A.钙吸收代谢障碍

B.磷吸收代谢障碍

C.甲状旁腺功能不足

D.维生素缺乏

E.神经系统兴奋性增高



11.关于高压蒸气灭菌法, 不正确的描述是

- A.灭菌效果最可靠
- B.适用于对耐高温和耐湿物品的灭菌
- C.可杀灭包括细菌芽胞在内的所有微生物
- D.通常灭菌压力为 $2.05\text{kg}/\text{cm}^2$
- E.通常灭菌温度为 121.3°C

12.高压蒸汽灭菌法通常在 $103.4\text{kPa}(1.05\text{kg}/\text{cm}^2)$ 的压力下维持时间为

- A.1 ~ 5 分钟
- B.6 ~ 10 分钟
- C.15 ~ 20 分钟
- D.30 ~ 40 分钟
- E.55 ~ 60 分钟

13.下列消毒灭菌法哪种是错误的

- A.牛奶-巴氏消毒
- B.排泄物-漂白粉



C.玻璃器材-流通蒸汽法

D.含糖培养基-间歇灭菌法

E.人或动物血清-滤过除菌

14.应用最普遍、效果可靠的物理灭菌法

A.高压蒸汽灭菌法

B.煮沸灭菌法

C.紫外线辐射消毒法

D.碘伏

E.器械消毒液

15.感染病人用后的手套、敷料和器械的处理叙述错误的是

A.经初步处理用清水冲洗干净，擦干或晾干，才能重新消毒

B.有条件者可用一次性物品

C.化脓性感染的手套、敷料放入专用污物袋内统一处理

D.绿脓杆菌感染的手套、敷料不必放入专用污物袋内统一处理

E.破伤风的手套、敷料放入专用污物袋内统一处理

16.精密器械如内镜消毒需要 2%戊二醛水溶液浸泡

- A.1 小时以上
- B.2 小时以上
- C.3 小时以上
- D.4 小时以上
- E.5 小时以上

17.刷手的顺序

- A.由指尖开始，反复进行
- B.由肘部开始，刷向手部
- C.自上而下，再自下而上
- D.自指尖开始，依次交替刷向上臂
- E.只要刷干净，无统一要求

18.穿手术衣的要求，以下哪项不正确

- A.不可将手术衣拿颠倒
- B.不可用手抓衣领外面
- C.可用手捏拉衣带

D.不可用手牵拉衣袖

E.不可用手折翻袖口

19.无菌切口消毒顺序是

A.以切口为中心，自上而下

B.以切口为中心，自下而上

C.以切口为中心，向四周

D.不可牵拉衣袖

E.不可用手折叠袖口

20.下列肾癌的生物学性状特点，不正确的是

A.高发年龄 50 ~ 60 岁，常为单侧、单灶性，肾上极或下极多见，少数侵及全身

B.中间型生长为主，由内向外侵蚀肾脏

C.分为透明细胞、颗粒细胞和未分化癌三种类型

D.生长方式呈膨胀型、浸润型和中间型

E.透明细胞癌最常见

二、A2 型题

1.女性，停经 90 天，近日阴道有少量不规矩出血，小腹隐痛。妇科体检：子宫达脐，未能及胎体，B 型超声子宫腔内为降雪状图像，最可能的诊断为

- A.葡萄胎
- B.羊水过量
- C.先兆流产
- D.子宫赘瘤
- E.子宫肌瘤

2.女 28 岁，孕 1 产 0，2 年前曾行吸刮术，术后常常下腹痛，近 3 个月来有性交痛，经期大便次数增多，妇科检查触及子宫直肠隐窝有触痛结节，其诊断最可能是

- A.慢性盆腔炎
- B.子宫内膜异位症
- C.肠功能紊乱
- D.生殖器结核
- E.直肠息肉

3.一男性患者，15 岁，右腋下起白斑 3 个月，发展缓慢，无不适。体检：上述可见一 2cm ×3cm 大小牛奶样白斑，界限清楚有少许色素沉着，表面光滑，摩擦后白斑呈淡红色，局部

部分腋毛变白。最可能的诊断是

- A.花斑癣
- B.白癜风
- C.贫血痣
- D.无色素痣
- E.继发性色素减退斑

扫码回复“基础测评”领取答案及解析



4.一男性患者，43岁，鼻部红斑5年，渐加重。嗜酒。体检：鼻尖部红斑、表面毛细血管

扩张、丘疹、脓疱和结节。以下哪项诊断正确

- A.酒渣鼻红斑期
- B.结节性痤疮
- C.毛囊炎
- D.酒渣鼻丘疹脓疱期
- E.酒渣鼻鼻赘期

5.4岁小儿，春季发病。体温39.1℃，咽部充血，眼部刺痛，颈部、耳后淋巴结肿大。幼儿园同班有数人有相同症状。本题最主要的病原体为

- A.腺病毒 3、7
- B.柯萨奇病毒 A 组
- C.溶血性链球菌
- D.副流感病毒
- E.流感杆菌

6.5岁男孩，高热1天，食欲不振，流涎。查体：T 39.6℃，咽部充血，软腭部可见数个疱疹及溃疡，腹平软，心肺无异常。最可能的诊断为

- A.流行性感
- B.疱疹性咽峡炎
- C.川崎病
- D.化脓性扁桃体炎
- E.咽结合膜热

7.某患者，男性，76岁。夜间睡眠中憋醒，气喘不能平卧，神志淡漠，皮肤花纹，黏膜苍



白，手脚冰凉，无尿，急诊作心电图示广泛前壁心肌梗死。查体：血压 70/40mmHg，心率 126 次/分，可闻及室性奔马律，两肺呼吸音粗。该例低血压的原因最可能是

- A.低血容量性休克
- B.心源性休克
- C.急性左心衰竭
- D.心律失常
- E.急性脑血管意外

8.患者女性，42 岁。腹痛、发热 48 小时，血压 80/60mmHg，意识清楚，面色苍白，四肢湿冷，全腹肌紧张，肠鸣音消失，首先考虑的诊断是

- A.感染性休克
- B.神经源性休克
- C.过敏性休克
- D.心源性休克
- E.低血容量性休克

9.男性，30 岁，车祸伤 30 分钟。体格检查：发绀，烦躁不安，呼吸困难，左侧大块胸壁软化，两肺湿啰音。首要的处理是

- A.紧急剖胸手术
- B.吸氧及雾化吸入
- C.清除呼吸道分泌物
- D.对软化胸壁牵引固定
- E.左侧胸腔闭式引流

10.患者，农民，2小时前修筑围墙时墙壁倒塌，致胸部以上压伤，主诉呼吸困难，无腹痛、呕吐等症。查体：血压140/110mmHg，脉率110次/min，呼吸34次/min。神清，双眼结膜有出血，颈静脉怒张，前胸及肩部有散在的出血点，尿常规阴性。最可能的诊断是

- A.创伤性窒息
- B.挤压伤综合征
- C.广泛软组织挫伤
- D.眼外伤
- E.创伤性休克

11.男性，27岁，2小时前摔伤头部，头顶部可见直径10cm血肿，意识清醒，伴有恶心、呕吐，急救处置时不恰当的措施是

- A.穿刺抽吸头皮下血肿

B.给予镇静剂

C.血压、脉搏、呼吸监测

D.注意意识状态

E.给予脱水剂

12.患者，女性，36岁。突发右侧肢体无力，伴言语不能就诊，查头颅CT未见异常。有风湿性心脏病、心房纤颤10年。最可能的诊断是

A.脑栓塞

B.脑血栓形成

C.脑出血

D.蛛网膜下腔出血

E.脑肿瘤

13.62岁，女性，晨起出现讲话不清，右侧肢体无力，两天后因病情渐加重就诊。血压110/80mmHg，意识清，运动性失语，右侧偏瘫，可完全排除的诊断是

A.脑栓塞

B.脑血栓形成

C.短暂性脑缺血发作

D.脑出血

E.腔隙性脑梗死

14.男, 60岁, 突然不能说话, 右侧肢体无力, 5~6分钟恢复, 反复发作, 发作后检查无

神经系统阳性体征。首先应考虑的诊断是

A.脑栓塞

B.局灶性癫痫发作

C.癔症发作

D.椎基底动系统 TIA

E.颈内动脉系统 TIA

15.男, 78岁。1天前突然失语伴右上肢活动无力进行性加重, 但意识清楚, 脑脊液检查无

异常。最可能的诊断是

A.短暂性脑缺血发作

B.脑血栓形成

C.脑栓塞

D.脑出血

E.蛛网膜下腔出血



16.患者，男性，65岁。晨醒后发现左肢乏力、言语含糊，次日乏力加重，不能行走。磁共振检查示右侧基底节区有一T₁低信号、T₂高信号病灶。既往有糖尿病史多年，平时血糖控制差。最可能的诊断是

- A.蛛网膜下腔出血
- B.短暂性脑缺血发作
- C.脑栓塞
- D.脑血栓形成
- E.脑出血

17.患者男性，55岁。既往有高血压病病史，反复右侧颈动脉TIA发作，阿司匹林治疗后仍反复发作，查右侧颈动脉狭窄>80%，选择治疗为

- A.脑保护治疗
- B.中药治疗
- C.抗血小板治疗
- D.改善循环治疗
- E.颈动脉内膜剥脱术（CEA）



18.女, 32 岁。购物时感头晕、恶心、乏力, 随即意识丧失, 摔倒在地, 约 1 分钟自行苏醒,

无大小便失禁, 无遗留意识或肢体功能障碍。其意识丧失最可能的病因是

A.迷走神经张力异常增高

B.分离(转换)性障碍

C.心律失常

D.低血糖症

E.短暂性脑缺血发作

19.男性患者, 29 岁, 风湿性心脏病二尖瓣狭窄、主动脉关闭不全病史多年, 因低热 2 周并

心衰加重入院, 目前考虑风湿活动与感染性心内膜炎。关于病原学诊断以下哪项正确

A.无论病情缓急, 入院抽血 3 次后立即抗 IE 治疗

B.采血量多少与血培养的阳性率无关

C.超声心动图明确有赘生物者, 不必抽血

D.严格规定抽血应在高热时

E.近期末用抗生素者, 正确采血培养阳性率高达 95%

20.一风湿性心脏病患者, 心率 120 次/分, 伴气促、房颤、颈静脉怒张、肝大, 首选药物

是

A.毛花苷丙静脉注射

B.普萘洛尔

C.利多卡因

D.氨茶碱

E.维生素 E

21.患者男性，28岁。风湿性心脏病患者，近半月来发热，T 38.3℃，右下睑结膜见一出血点，双肺无啰音，脾肋下可扪及边缘，双下肢皮肤少数紫癜。血红蛋白 100g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 75%，血小板 $150 \times 10^9/L$ 。应考虑的诊断是

A.过敏性紫癜

B.脾功能亢进

C.亚急性感染性心内膜炎

D.急性白血病

E.再生障碍性贫血

三、B型题

1.A.脑出血

B.蛛网膜下腔出血

C.短暂性脑缺血发作

D.脑血栓形成

E.脑栓塞

- 1) 起病速度最快的是
- 2) 起病速度最慢的是
- 3) 头痛最剧烈的是
- 4) CT可显示脑实质高密度灶的是
- 5) 常在安静中起病的是

2.A.夜间阵发性呼吸困难，不能平卧，咯泡沫痰

B.夜间阵发性呼吸困难，能平卧，咯白黏痰

C.下垂性双下肢对称性水肿

D.晨起面部浮肿

E.颈静脉怒张，肝颈回流征阳性

- 1) 肾性水肿
- 2) 肺源性哮喘



3) 心源性水肿

4) 心源性哮喘

扫码回复“基础测评”领取答案及解析

