

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2023年第15期

问题索引:

1. 【问题】呕血与咯血的区别?
2. 【问题】空腔脏器破裂主要临床表现是?
3. 【问题】药物吸收速度排序?
4. 【问题】隔离种类分为?

具体解答:

1. 【问题】呕血与咯血的区别?

【解答】

	呕血	咯血
(1) 病史	呕血患者多有胃、十二指肠溃疡, 肿瘤或肝硬变等病史	咯血患者一般有结核, 支气管扩张或心肺疾病等
(2) 出血方式	呕血多随呕吐引起	咯血一般是咳嗽后吐出
(3) 血液颜色	呕血的颜色呈紫红或咖啡色, 无泡沫	咯血的则为鲜红, 有泡沫
(4) 内容物	呕血的食物残渣及胃液	咯血的混有痰液
(5) 出血前症状	呕血前常先发生上腹疼痛, 饱胀不适	咯血前常有喉痒、咳嗽、胸闷
(6) 血液反应	呕血的血液呈酸性	咯血的血液呈弱碱性
(7) 大便检查	呕血患者常拉柏油样便, 大便隐血试验阳性	咯血患者大便隐血试验常阴性, 除非吞下血液外, 一般粪便正常

2. 【问题】空腔脏器破裂主要临床表现是?

【解答】空腔脏器损伤: 如肠、胃、胆囊、膀胱等破裂或穿孔。

临床表现以腹膜炎症状和体征为主。伤后有恶心、呕吐, 伴持续性剧烈腹痛, 出现腹肌紧张、压痛、反跳痛等典型的腹膜炎表现。肝浊音界缩小, 肠鸣音减弱或消失, 随着病情发展可有体温升高、脉细弱、气促、血压下降、肠麻痹等, 严

重者发生感染性休克。

3. 【问题】药物吸收速度排序？

【解答】药物吸收速度除静脉和动脉注射是将药液直接注入静脉和动脉进入血循环外，其他药物吸收顺序为：气雾吸入>舌下含服>直肠给药>肌内注射>皮下注射>口服给药>皮肤给药。

4. 【问题】隔离种类分为？

【解答】(1) 严密隔离：适用于霍乱、鼠疫等甲类或传染性极强的乙类传染病。

(2) 呼吸道隔离：适用于流行性感冒、腮腺炎、麻疹、白喉、水痘等通过空气飞沫传播的呼吸道传染病。

(3) 消化道隔离：适用于伤寒、细菌性痢疾、甲型肝炎等通过粪-口途径传播的疾病。

(4) 接触隔离：适合于狂犬病、破伤风等经皮肤伤口传播的疾病。

(5) 昆虫隔离：适用于通过蚊子、蚤、虱、蜱、恙螨等昆虫叮咬传播的疾病，如疟疾、斑疹伤寒等。

(6) 血液—体液隔离：适用于预防直接或间接接触血液和体液传播的传染性疾病，如艾滋病、梅毒、乙型肝炎等。

(7) 保护性隔离：保护性隔离也称反向隔离，适用于抵抗力低下或极易感染的患者，如早产儿及严重烧伤、白血病、脏器移植、免疫缺陷等患者。