

医学教育网临床助理医师考试:《答疑周刊》2023年第23期

女性生殖系统正常分娩非常重要,理解了正常分娩才能更好的对待异常分娩。这里介绍正常分娩的相关考点。

问题索引:

1. 母乳喂养的益处有哪些?
2. 孕妇临产的标志有哪些?
3. 人工破膜的指征有哪些?

具体解答:

1. 母乳喂养的益处有哪些?

下列关于母乳喂养的说法不正确的是

- A. 提供营养及促进发育
- B. 提高免疫力, 抵御疾病
- C. 降低母亲患乳腺癌、卵巢癌的危险性
- D. 有利于新生儿心理发展
- E. 不利于防止产后出血

【答案】E

【解析】母乳喂养

(1) 对新生儿有益: ①提供营养及促进发育; ②提高免疫功能, 抵御疾病; ③有利于牙齿的发育和保护; ④有利于新生儿心理发展。

(2) 对母亲有益: ①有助于防止产后出血; ②哺乳期闭经有利于产后恢复, 有利于延长生育间隔。③降低母亲患乳腺癌、卵巢癌的危险性。[医学教育网原创]

2. 孕妇临产的标志有哪些?

正式发动分娩的主要表现为

- A. 见红
- B. 下腹隐痛

- C. 宫颈变软
- D. 规律宫缩
- E. 胎先露部衔接

【答案】 D

【解析】 临产开始的标志为:

- (1) 规律且逐渐增强的子宫收缩, 持续 30 秒或以上, 间歇 5~6 分钟。
- (2) 伴随进行性宫颈管消失、宫口扩张。
- (3) 胎先露部下降。
- (4) 用强镇静药物不能抑制宫缩。[医学教育网原创]

3. 人工破膜的指征有哪些?

患者女性, 28 岁。孕 38+周, 上午 9 时有规律宫缩而入院。宫缩中下, 35 秒, 间隔 3~4 分钟, 于 19 时宫口开一指, 先露 S-1.5, 给予催产素 2.5 单位加强宫缩使转为中等强度, 40 秒, 间隔 2~3 分钟, 产妇一般情况好, 3 小时后宫口开大 4cm, 先露为 S-1, 此时应如何处理

- A. 阴道检查排除骨产道异常后做人工破膜
- B. 剖宫产
- C. 加大催产素滴注量
- D. 哌替啶 (杜冷丁) 100mg 肌注使休息
- E. 宫颈注射阿托品

【答案】 A

【解析】 因为中等强度, 40 秒, 间隔 2~3 分钟, 诊断为协调性宫缩乏力时, 人工破膜的目的就是用来加强宫缩、促进产程进展的。破膜后, 胎头直接紧贴子宫下段及宫颈内口, 引起反射性子宫收缩, 加速产程进展。协调性宫缩乏力时, 人工破膜指征: 宫口扩张 3cm 或 3cm 以上、无头盆不称、胎头已衔接者, 可行人工破膜。[医学教育网原创]