



医学教育网外科主治医师：《答疑周刊》2024年第31期

本期汇总了一下关于骨外科相关考点，大家一起来学习一下。

问题索引：

1. 骨与关节结核最常见的好发部位是什么？
2. 对于骨与关节结核的诊断和疗效判断，最常用的检查是什么？
3. 诊断成人脊柱结核最可靠的依据是什么？

具体解答：

1. 骨与关节结核最常见的好发部位是

- A. 踝关节
- B. 髋关节
- C. 膝关节
- D. 脊柱
- E. 肘关节

【答案】D

【解析】骨与关节结核好发于儿童与青少年，原发病灶为肺结核或[医学教育网原创]消化道结核，好发部位是脊柱，其次是膝关节、髋关节与肘关节。

2. 对于骨与关节结核的诊断和疗效判断，最常用的是

- A. 实验室检查
- B. CT 检查
- C. 全身症状
- D. 局部体征
- E. X 线检查

【答案】E

【解析】治愈的标准为：①全身情况良好，体温正常，食欲良好；②局部症状消失，无疼痛，窦道闭合；③X 线表现脓肿缩小乃至消失，或已经钙化，无死骨，病灶边缘轮廓清晰；④3 次血沉都正常；⑤起床活动已 1 年，仍能保持上述 4 项指标。符合标准的可以停止[医学教育网原创]抗结核药物治疗，但仍需定期复查。



X线可以有用于疗效判断。

3. 诊断成人脊柱结核最可靠的依据是

- A. 结核菌素试验
- B. X线检查示相邻椎体边缘模糊、椎间隙变窄
- C. 有低热、盗汗史
- D. 全身虚弱、贫血
- E. 血沉快

【答案】B

【解析】脊柱结核病理改变有两种，一是中心型结核，多见于10岁以下儿童，好发于胸椎、整个椎体压缩楔变，病变进展快，一般只累及一个椎体。二是边缘型椎体结核，多见于成人，腰椎好发，病变局限于[医学教育网原创]椎体上下缘，很快侵犯至椎间盘及相邻椎体，椎间盘破坏是本病的特征，因而椎间隙很窄。